



دليلك لاستخدام أيليا® (أليليرسبت)

أيليا® ١١٤,٣ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
أليليرسبت

أيليا® ٤ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
أليليرسبت

جدول المحتويات

٢	علاج ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر.
٨	علاج الوذمة البقعية الصفراء (الشبكية) الناتجة عن داء السكر.
١٤	علاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.
٢٠	علاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.
٢٦	علاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

تمت الموافقة على هذه الوثيقة من قبل الإدارة التنفيذية للتقيظ الدوائي بالعية العامة للغذاء والدواء

دليلك لاستخدام

أيليا®

(أفليبرسبت)

أيليا® ١١٤,٣ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
أفليبرسبت

أيليا® ٤٠ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
أفليبرسبت

يستخدم أيليا لـ

علاج ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف لهم أيليا (محلول أفليبرسبت للحقن) لعلاج ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر. تمت دراسة جرعة أيليا ٢ ملغ وجرعة أيليا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر ووذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر. قد يعطيك طبيبك إما جرعة أيليا ٢ ملغ أو جرعة أيليا ٨ ملغ، حسب حالتك. إذا تم إعطاء جرعة أيليا ٢ مجم، فسيستخدم طبيبك محلول أيليا ٤٠ مجم / مل. إذا تم إعطاء جرعة أيليا ٨ ملغ، فسيستخدم طبيبك محلول أيليا ١١٤,٣ ملغ/مل.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

وصف طبيبك أيليا لأنه تم تشخيص إصابتك بضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر

ما هو ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر ؟

شبكة العين هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العين تستشعر الضوء وترسل الرسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. البقعة الصفراء هي منطقة مهمة في مركز الشبكة تسمح لك برؤيا تفاصيل الأشياء التي أمامك بوضوح، مثل الوجوه والكلمات في الكتب. يحدث ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر عندما تنمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية تحت شبكة العين. يمكن أن يحدث هذا مع تقدم العمر وتراكم نواتج تحلل المركبات في شبكة العين. ويعود نمو هذه الأوعية غير الطبيعية إلى ارتفاع المستويات الطبيعية في العين لبروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، ويشارك VEGF في تكوين الأوعية الدموية غير الطبيعية في العين. قد تسرب هذه الأوعية دماً أو سوائل أخرى وقد تسبب تندب في البقعة الصفراء. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان الرؤية المركزية بشكل دائم.

ما هو أيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة ، وهذا الإجراء يساعد على تقليل السوائل في شبكة العين ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية والحفاظ عليها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العين. وهو متوفّر بجرعة ٢ ملغ وجرعة ٨ ملغ. سيحدد طبيبك الجرعة الأنسب لحالتك. سيوصي طبيبك أيضًا بجدول علاجي لك ومن المهم جدًا أن تتبعه.

لمن يوصى عقار أيليا؟

أيليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- اذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حالياً احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- اذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليود أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا
- اذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- اذا كان لديك الجلوكوما او (المياه الزرقاء) أو تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو " أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- اذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- اذا أجريت او كنت ستتعرض لعملية جراحية للعين في غضون 4 أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا
- اذا كنت حامل أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا 2 ملغ و أيليا 8 ملغ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا 2 ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.

- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٨ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع الحمل الفعالة لمدة أربعة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.

• قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.

• آثار أفيبرسبت على الرضيع غير معروفة.

• لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدي مع أيليا؟

• قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبعض أيام قبل موعدك.

• بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.

• خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.

• تجنبي استخدام أو وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختباراً يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعاً متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي هذه الأعراض خلال بضعة أيام، وإذا لم تختفي، أو إذا تفاقمت، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض من المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

بعض العلامات أو الأعراض المحتملة	حالة
ألم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.	الدوى أو التهاب داخل العين
رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهتة")	تغير العدسة (إعتام عدسة العين)
رؤية الهالات حول الأضواء ألم في العين تجربة العين الحمراء الغثيان أو القيء	زيادة في الضغط في العين

تغيرات الرؤية	
ومضات مفاجئة من الضوء ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية تغيرات الرؤية.	أنفصال أو تمزق طبقة من شبکية العين

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكوره في آخر الكتيب

ماذا لو كانت لدى مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنكم التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

دلیلک لاستخدام

أیلیا®

(افلیبرسیت)

أیلیا® ١١٤,٣ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افلیبرسیت

أیلیا® ٤ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افلیبرسیت

يستخدم أیلیا لـ

علاج الوذمة البقعية الصفراء (الشبكية) الناتجة عن داء السكر.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف لهم أیلیا (محلول افليبرسیت للحقن) لعلاج ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر. تمت دراسة جرعة أیلیا ٢ ملغ وجرعة أیلیا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر وفي وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) ناتجة داء السكر. قد يعطيك طبيبك إما جرعة أیلیا ٢ ملغ أو جرعة أیلیا ٨ ملغ، حسب حالتك. إذا تم إعطاء جرعة أیلیا ٢ مجم، فسيستخدم طبيبك محلول أیلیا ٤٠ مجم / مل. إذا تم إعطاء جرعة أیلیا ٨ ملغ، فسيستخدم طبيبك محلول أیلیا ١١٤,٣ ملغ/مل.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

لقد وصف طبيبك أيليا لأنه تم تشخيص إصابتك وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر.

ما هو وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر؟

وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر هي حالة تحدث عندما يتراكم السائل في شبکية العين. شبکية العين هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العين تستشعر الضوء وترسل رسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. البقعة الصفراء هي منطقة مهمة في مركز الشبکية تسمح لك برؤية تفاصيل الأشياء التي أمامك بوضوح، مثل الوجوه والكلمات في الكتب.

يصاحب مرض السكري ارتفاع قيم السكر في الدم أو التقلبات العالية في نسبة السكر في الدم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تلف الأوعية الدموية الصغيرة وانخفاض الدورة الدموية في العين، ويؤدي إلى تورم في شبکية العين وضبابية الرؤية. ويعود التورم إلى ارتفاع المستويات الطبيعية في العين لبروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، ويؤدي VEGF إلى رش الأوعية الدموية التي تسبب إلى التورم. مع مرور الوقت، يمكن أن يؤدي التورم إلى تلف شبکية العين، ويمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية المركزية بشكل دائم.

ما هو أيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة ، ويساعد هذا الإجراء على تقليل التورم في شبکية العين ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية وصيانتها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العين. وهو متوفّر بجرعة 2 ملّغ وجرعة 8 ملّغ. سيحدد طبيبك الجرعة الأنسب لحالتك. سيوصي طبيبك بجدول علاجي لك ومن المهم جدًا أن تتبعه.

لمن يوصف عقار أيليا ؟

أيليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بونمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا ؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- اذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حالياً احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- اذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليود أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا
- اذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- اذا كان لديك الجلوكوما او (المياة الزرقاء) أو تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو " أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- اذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- اذا أجريت او كنت ستتعرض لعملية جراحية للعين في غضون 4 أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا
- اذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

اذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا 2 ملغ و أيليا 8 ملغ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا 2 ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.

- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٨ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع الحمل الفعالة لمدة أربعة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.
- قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.
- آثار أفيبرسبت على الرضيع غير معروفة.
- لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدي مع أيليا؟

- قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبضعة أيام قبل موعدك.
- بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.
- خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.
- تجنبي استخدام أو وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختباراً يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعاً متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي هذه الأعراض خلال بضعة أيام، وإذا لم تختفي، أو إذا تفاقمت، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

بعض العلامات أو الأعراض المحتملة	حالة
ألم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.	الدوى أو التهاب داخل العين
رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهتة")	تغير العدسة (إعتام عدسة العين)
رؤية الحالات حول الأضواء ألم في العين تجربة العين الحمراء الغثيان أو القيء	زيادة في الضغط في العين

تغيرات الرؤية	
ومضات مفاجئة من الضوء ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية تغيرات الرؤية.	أنفصال أو تمزق طبقة من شبكيّة العين

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).
الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكوره في اخر الكتب

ماذا لو كانت لدى مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنك التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

دلیلک لاستخدام
أیلیا®
(افلیبرسبت)

أیلیا® ٤ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افلیبرسبت

يستخدم أیلیا لـ
علاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف جرعة أیلیا ٢ ملغ لهم (محلول افلیبرسبت للحقن) الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي. تمت دراسة جرعة أیلیا ٢ ملغ وجرعة أیلیا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر وفي وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر. لم تتم دراسة جرعة أیلیا ٨ ملغ في الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

وصف طبيبك أيليا لأنه تم تشخيص إصابتك بالوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.

ما هو الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي؟

شبکية العین هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العین تستشعر الضوء وترسل الرسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. البقعة الصفراء هي منطقة مهمة في مركز الشبکية تسمح لك برؤیة تفاصيل الأشياء التي أمامك بوضوح، مثل الوجوه والكلمات في الكتب. تحتوي شبکية العین على شريان رئيسي واحد ووريد رئيسي واحد. مع تقدم العمر، تغير مرونة الأوعية الدموية ويمكن أن تصبح مسدودة أو محتقنة بسهولة أكبر. تحدث الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبکي المركزي عندما ينسد الوريد الشبکي الرئيسي. وهذا يشبه حدوث تجلط في شبکية العین، و يؤدي إلى تراكم الدم في الأوعية الدموية.

يؤدي هذا إلى إطلاق الشبکية لبروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية الدموية و يشارك في نمو الأوعية الدموية، ولكنه قد يؤدي إلى رشح الأوعية الدموية . تسبب هذه الأوعية الدموية الرائحة في التورم و تسرب دم غير مرغوب فيه في العین، مما قد يؤدي إلى تلف شبکية العین. وفي الوقت نفسه، قد لا يزال الانسداد الأصلي موجوداً مما يؤدي إلى تفاقم المشكلة. ونتيجة لذلك، يمكن أن تتأثر رؤيتك المركزية بشدة.

ما هو أيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة، ويساعد هذا الإجراء على تقليل التورم في شبکية العین ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية وصيانتها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العین. لعلاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبکي المركزي ، يتوفّر أيليا بجرعة 2 ملغ. سيوصي طبيبك أيليا أيضًا بجدول علاجي لك ومن المهم جدًا أن تتبعه.

لمن يوصى عقار أيليا؟

أيليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي المركزي.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- اذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حالياً احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- اذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليود أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا
- اذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- اذا كان لديك الجلوكوما او (المياه الزرقاء) او تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو " أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- اذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- اذا أجريت او كنت ستتعرض لعملية جراحية للعين في غضون 4 أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا
- اذا كنت حامل أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا 2 ملغ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا 2 ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

- الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.
- قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.
- آثار أفيبرسبت على الرضيع غير معروفة.
- لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدي مع أيليا؟

- قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبضعة أيام قبل موعدك.
- بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.
- خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.
- تجنب استخدام أو وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختباراً يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

خلال الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعاً متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي هذه الأعراض خلال بضعة أيام، وإذا لم تختفي، أو إذا تفاقمت، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

بعض العلامات أو الأعراض المحتملة	حالة
الم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.	العدوى أو التهاب داخل العين
رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهتة")	تعييم العدسة (إعتام عدسة العين)
رؤية الهالات حول الأضواء الم في العين	زيادة في الضغط في العين

تجربة العين الحمراء الغثيان أو القيء تغيرات الرؤية	
ومضات مفاجئة من الضوء ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية تغيرات الرؤية.	أنفصال أو تمزق طبقة من شبکية العين

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكوره في آخر الكتيب

ماذا لو كانت لدى مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنك التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

دلیلک لاستخدام
أیلیا®
(افلیبرسبت)

أیلیا® ٤٠ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
 افليبرسبت

يستخدم أیلیا لـ
 علاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف جرعة أیلیا ٢ ملغ لهم (محلول افليبرسبت للحقن) لعلاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي. تمت دراسة جرعة أیلیا ٢ ملغ وجرعة أیلیا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر وفي وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر.. لم تتم دراسة جرعة أیلیا ٨ ملغ في الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

وصف طبيبك أيليا لأنه تم تشخيص إصابتك بالوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.

ما هو الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي؟

شبکية العین هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العین تستشعر الضوء وترسل الرسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. البقعة الصفراء هي منطقة مهمة في مركز الشبکية تسمح لك برؤیة تفاصيل الأشياء التي أمامك بوضوح، مثل الوجوه والكلمات في الكتب. مع تقدم العمر، تتغير مرونة الأوعية الدموية ويمكن أن تصبح مسدودة أو محتقنة بسهولة أكبر. يحدث الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبکي الفرعي عندما ينسد واحد أو أكثر من فروع الوريد الشبکي الرئيسي. وهذا يشبه تجلط الدم في جزء واحد من شبکية العین. ويؤدي إلى تراكم الدم في الأوعية الدموية.

يؤدي هذا إلى إطلاق الشبکية لبروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية الدموية ويشارك في نمو الأوعية الدموية، ولكنه قد يؤدي إلى رشح الأوعية. تسبب هذه الأوعية الدموية الرائحة في التورم وتسرب دم غير مرغوب فيه في العین. يمكن أن يشمل التورم البقعة الصفراء، وإذا حدث ذلك، فقد تتأثر رؤيتك المركزية بشدة. مع مرور الوقت، إذا لم تكن هناك دورة دموية في هذه المنطقة، يمكن أن تموت الخلايا العصبية في العین ويمكن أن تصبح رؤيتك أسوأ.

ما هو أيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة، ويساعد هذا الإجراء على تقليل التورم في شبکية العین ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية وصيانتها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العین. لعلاج الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبکي الفرعي ، يتوفّر أيليا بجرعة 2 ملغ. طبيبك سيوصي لك أيضًا بجدول علاجي ومن المهم أن تتبعه.

لمن يوصى عقار أيليا؟

أيليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بـ الوذمة البقعية الناتجة عن انسداد الوريد الشبكي الفرعي.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- اذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حالياً احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- اذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليد أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا
- اذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- اذا كان لديك الجلوكوما او (المياه الزرقاء) او تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو " أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- اذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- اذا أجريت او كنت ستتعرض لعملية جراحية للعين في غضون 4 أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا
- اذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

اذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا 2 ملغ و أيليا 8 ملغ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا 2 ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.

- قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.
- آثار أفاليرسبت على الرضيع غير معروفة.
- لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدي مع أيليا؟

- قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبضعة أيام قبل موعدك.
- بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.
- خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.
- تجنبي استخدام أو وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختباراً يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

في الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعاً متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي كلتا الحالتين في غضون أيام قليلة، وإذا لم يحدث ذلك، أو إذا تفاقمت، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

ناماً مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

بعض العلامات أو الأعراض المحتملة	حالة
ألم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.	الدوى أو التهاب داخل العين
رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهنة")	تغير العدسة (إعتام عدسة العين)
رؤية الهالات حول الأضواء ألم في العين تجربة العين الحمراء	زيادة في الضغط في العين

<p>الغثيان أو القيء</p> <p>تغيرات الرؤية</p>	
<p>ومضات مفاجئة من الضوء</p> <p>ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات</p> <p>تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية</p> <p>تغيرات الرؤية.</p>	<p>أنفصال أو تمزق طبقة من</p> <p>شبكيّة العين</p>

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكوره في آخر الكتيب

ماذا لو كانت لدى مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنكم التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

دليك لاستخدام

أيليا®

(افليبرسبت)

أيليا® ٤ مجم/مل

محلول للحقن داخل العين
افليبرسبت

يستخدم أيليا لـ

علاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

تم إنتاج الكتيب للأشخاص الذين تم وصف جرعة أيليا ٢ ملغ لهم (محلول افليبرسبت للحقن) لعلاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر. تمت دراسة جرعة أيليا ٢ ملغ وجرعة أيليا ٨ ملغ في ضمور البقعة الصفراء المرتبط بتقدم العمر وفي وذمة البقعة الصفراء (الشبكية) نتيجة داء السكر. لم يتم دراسة جرعة أيليا ٨ ملغ لعلاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

مزيد من المعلومات متاحة لك في نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

وصف طببك أيليا لأنه تم تشخيص إصابتك بضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

ما هو ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر؟

شبكة العين هي طبقة الخلايا المبطنة للجدار الخلفي داخل العين و تستشعر الضوء و ترسل رسائل إلى الدماغ، مما يتيح لك الرؤية. في الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر الشديد (قصر النظر)، يحدث تضخم أو استطالة في كرة العين. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تمدد و ترقق شبكة العين. هذا التردد يمكن أن يسبب نمو أوعية دموية جديدة من المشيمية. المشيمية هي طبقة من العين تقع خلف شبكة العين، والتي توفر إمدادات الدم إلى العين. ويعود نمو هذه الأوعية المتسلبة إلى ارتفاع مستويات بروتين يسمى Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) أو عامل نمو بطانة الأوعية، ويشارك VEGF في تكوين هذه الأوعية الدموية الجديدة في العين. يمكن أن تسبب هذه الأوعية الدموية الجديدة تسرب الدم والسوائل إلى العين، مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المركزية أو تشويهها.

ما هو أيليا؟

أيليا هو نوع من العلاج يُعرف بالعوامل المضادة لنمو بطانة الأوعية الدموية (Anti-VEGF)، وهذا وصف لكيفية عمل أيليا لحماية نظرك. أيليا يحجب البروتين المسؤول عن تشكيل الأوعية الدموية الجديدة ، ويساعد هذا الإجراء على تقليل التورم في شبكة العين ويمكن أن يؤدي إلى تحسين الرؤية وصيانتها.

أيليا هو محلول (سائل) يتم حقنه في العين. لعلاج ضعف الرؤية الناتج عن تكوين أوعية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر ، يتوفّر أيليا بجرعة ٢ ملغم. سيوصي طببك أيضًا بجدول علاجي لك ومن المهم أن تتبعه.

لمن يوصى عقار أيليا؟

أيليا مخصص للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بضعف الرؤية الناتج عن تكوين أو عية مشيمية جديدة المترتبة على قصر النظر.

ما الذي يجب أن يعرفه طبيبك قبل العلاج بـ أيليا؟

قبل بدء علاج أيليا ، تأكد من إخبار طبيبك ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين بالتالي:

- اذا كانت لديك عدوى في عينك أو المنطقة المحيطة بها
- إذا كان لديك حالياً احمرار في عينك أو إذا كان هناك أي ألم في عينك
- اذا كنت تعتقد أنك قد تكون لديك حساسية تجاه اليود أو أي مسكنات للألم أو أي من مكونات أيليا
- اذا واجهت أي مشاكل مع حقن العين من قبل
- اذا كان لديك الجلوكوما او (المياه الزرقاء) أو تاريخ من ارتفاع الضغط في عينك
- إذا رأيت ومضات من الضوء أو " أجسام طافية" أثناء رؤيتك
- اذا تناولت أي أدوية، بوصفة طبية أو بدونها
- اذا أجريت او كنت ستتعرض لعملية جراحية للعين في غضون ٤ أسابيع قبل أو بعد العلاج بـ أيليا
- اذا كنت حامل أو تخططين للحمل أو الرضاعة.

استخدام أيليا والحمل

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل أو الرضاعة :

- هناك القليل جداً من المعلومات حول سلامة استخدام أيليا لدى النساء الحوامل.
- لا ينبغي استخدام أيليا ٢ أثناء الحمل، إلا إذا كانت الفائدة تفوق المخاطر على الجنين. ناقش هذا مع طبيبك قبل العلاج بـ أيليا.
- يجب على النساء ذوات القدرة على الإنجاب استخدام وسائل منع الحمل الفعالة أثناء علاجهن بـ أيليا.
- إذا تم علاجك بجرعة أيليا ٢ ملغ، فيجب عليك الاستمرار في استخدام وسائل منع

الحمل الفعالة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد الحقن الأخير.

- قد يدخل كميات صغيرة من أيليا في حليب الأم.
- آثار افليبرسبت على الرضيع غير معروفة.
- لا ينصح باستخدام أيليا أثناء الرضاعة الطبيعية.

كيف يمكنني الاستعداد لموعدي مع أيليا؟

- قد يطلب منك طبيبك استخدام قطرات العين لبضعة أيام قبل موعدك.
- بعد العلاج، قد تصبح رؤيتك ضبابية لذا لا يجب عليك القيادة إلى المنزل.
- خطط لجعل صديق أو فرد من العائلة يصطحبك إلى موعدك أو قم بترتيب طريقة أخرى للوصول إلى هناك والعودة إلى المنزل مرة أخرى.
- تجنبي استخدام أو وضع مساحيق التجميل في يوم موعدك.

ماذا يمكنني أن أتوقع بعد علاج أيليا؟

قد يقوم طبيبك بإجراء بعض اختبارات العين بعد حقن أيليا. قد يشمل ذلك اختباراً يقيس الضغط داخل عينك. بعد الحقن، ستكون رؤيتك ضبابية لذا يجب ألا تخطط للقيادة إلا بعد عودة رؤيتك إلى وضعها الطبيعي.

في الأيام القليلة المقبلة، قد تحصل على عين محتقنة بالدم أو ترى بقعاً متحركة في رؤيتك. يجب أن تختفي كلتا الحالتين في غضون أيام قليلة، وإذا لم يحدث ذلك، أو إذا تفاقمت، فيجب عليك الاتصال بطبيبك.

قد يشعر بعض الأشخاص بقليل من الألم أو الانزعاج في أعينهم بعد الحقن. إذا لم يختفي هذا أو أصبح أسوأ، يجب عليك الاتصال بطبيبك.

هل لدى أيليا آثار جانبية؟

مثل أي دواء، لدى أيليا القدرة على التسبب في آثار جانبية.

اتصل بطبيبك على الفور إذا كان لديك أي علامات أو أعراض المذكورة في الجدول أدناه، حيث قد تكون هذه علامات على وجود مضاعفات خطيرة في العلاج:

بعض العلامات أو الأعراض المحتملة	حالة
ألم في العين أو زيادة الانزعاج تفاقم احمرار العين حساسية للضوء تورم الجفن تغيرات في الرؤية مثل انخفاض مفاجئ في الرؤية أو عدم وضوح الرؤية.	العدوى أو التهاب داخل العين
رؤية ضبابية رؤية الظلال خطوط وأشكال أقل حيوية تغيرات في رؤية الألوان (على سبيل المثال، تبدو الألوان "باهتة")	تغير العدسة (إعتام عدسة العين)
رؤية الهالات حول الأضواء ألم في العين تجربة العين الحمراء	زيادة في الضغط في العين

<p>الغثيان أو القيء</p> <p>تغيرات الرؤية</p>	
<p>ومضات مفاجئة من الضوء</p> <p>ظهور مفاجئ أو زيادة الطوافات</p> <p>تأثير يشبه الستارة على جزء من منطقة الرؤية</p> <p>تغيرات الرؤية.</p>	<p>أنفصال أو تمزق طبقة من شبكيّة العين</p>

للاطلاع على قائمة الآثار الجانبية كاملة، يرجى الرجوع إلى نشرة معلومات المريض (النشرة الداخلية في علبة الدواء).

الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك عن طريق وسائل الاتصال المذكوره في آخر الكتيب

ف

ماذا لو كانت لدى مخاوف أو أسئلة؟

إذا كانت لديك أية مخاوف أو أسئلة، فإن طبيبك أو ممرضتك هم أفضل الأشخاص الذين يمكنك التحدث إليهم. إنهم يتمتعون بخبرة كبيرة ويعرفون حالتك لذا يمكنهم تزويدك بالإجابات التي تحتاجها.

تمت مراجعة هذا الكتيب والموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرجاء الإبلاغ عن أي أعراض جانبية لدوائك إلى:

المركز الوطني للتنبؤ

الرقم الموحد لهيئة الغذاء و الدواء : ١٩٩٩

البريد الإلكتروني: npd.drug@sfda.gov.sa

الموقع الإلكتروني : <https://ade.sFDA.gov.sa/Home/Report>

أو

شركة باير العربية السعودية المحدودة

برج طريق الملك - طريق الملك عبد العزيز

جدة، المملكة العربية السعودية

هاتف: +٩٦٦١٢٦٥٧٣٠١٥

البريد الإلكتروني: pv.me@bayer.com

أو الموقع الإلكتروني: <https://www.safetrack-public.bayer.com/>

للاستفسارات الطبية : med-info.me@bayer.com

تخضع المعلومات المرسلة إلى تفاصيل الاتصال المذكورة أعلاه لبيان خصوصية شركة باير

وأو بيان خصوصية شركة باير لبيانات https://dps.bayer.com/ph/sa/en/data_privacy_statement

البيضة الدوائية <https://www.bayer.com/en/privacy-statement-pv> وقد يتم نقلها خارج بلدك، بما في ذلك

على سبيل المثال لا الحصر، النقل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية.

